

¿Sabes qué es el TEA?

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un grupo de condiciones del desarrollo que pueden significar un gran reto en la comunicación, comportamiento e integración social para los peques.



PDD-NOS

Trastorno generalizado del desarrollo-no especificado:

Pocos síntomas, podría causar dificultades sociales y comunicativas.



Asperger

Síndrome de Asperger:

Síntomas menos severos, podría tener dificultades sociales además de intereses y comportamientos inusuales a los que concebimos como "comunes".



Autismo

Desorden autista ó Autismo "clásico":

Dificultad significativa en el lenguaje o en la integración social y para comunicarse, comportamientos e intereses inusuales, constante repetición de palabras o acciones.

El cerebro de las personas con TEA procesa la información de manera diferente.

“¿Las vacunas causan autismo?”

NO. Estudios realizados en Estados Unidos y Europa no encontraron relación entre la vacuna triple viral (MMR) y el autismo.

Pediatras y padres pueden sentirse seguros al usar la vacuna triple viral (MMR) en los niños.



El autismo no es una discapacidad, es un grupo de desórdenes en el desarrollo del cerebro llamado “Espectro del Trastorno Autista” (TEA).

Algunos niños con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) se desarrollan “normalmente” de entre los 18 hasta los 24 meses de edad. En ese momento se ralentizan sus capacidades para aprender nuevas habilidades o incluso podrían perder las que ya han adquirido.

Entonces, ¿qué hacen las vacunas?

Protegen a los niños de 14 enfermedades desde los dos años de edad, la viruela, sarampión y meningitis pueden ser mortales para los niños que no han sido vacunados.

El número de antígenos con los que luchan los peques día a día son entre 2,000 y 6,000

Hay combinaciones de hasta 150 antígenos en las vacunas de la cartilla de vacunación. Entonces, el sistema inmunológico de un niño es capaz de manejarlo.



Los pequeños con TEA podrían presentar algunos comportamientos como:

- No responder a su nombre después de cumplir un año.
- Suelen no señalar objetos o mostrar interés en ellos después de los dos años de edad.
- Establecen un limitado contacto visual y prefieren estar solos.

La intervención temprana es clave, el camino más efectivo para tratar los síntomas del autismo. Plática con tu médico o especialista de la salud tus preocupaciones y dudas para evaluar el tratamiento individual que corresponda para tu peque.